



REDUKCIA ceny prípravku



Bratislava 7. apríla 2008

Vážená pani doktorka/pán doktor,

celoeurópskym trendom v posledných rokoch je rastúci záujem pacientov nielen o ich zdravie, ale aj o vzhľad. V súčasnosti ste už spozorovali vo svojich ordináciách zvýšený záujem pacientov o preparáty na redukciu hmotnosti.

AKO POMÔČť PACIENTOM SCHUDNÚŤ?

Využite dlhoročné skúsenosti s originálnym preparátom **Reductil® (originálny sibutramín)**, ktorý od uvedenia na trh úspešne užívalo viac ako 23 miliónov ľudí v 83 krajinách celého sveta!

TO NIE JE ZÁZRAK, TO JE MEDICÍNA

Reductil® (originálny sibutramín) má preverenú účinnosť vo viac ako 100 klinických štúdiách, v ktorých bolo zaradených viac ako 12 000 pacientov!

Využite možnosť pomôcť svojim pacientom znížiť ich hmotnosť za „chutné ceny“. Zredukovali sme ceny účinne tak, ako pomôže **Reductil® (originálny sibutramín)** redukovať hmotnosť vašim pacientom.

NOVÉ CENY PLATNÉ VO VŠETKÝCH LEKÁRŇACH OD 7.4. 2008:

Reductil® (originálny sibutramín)

| Balenie | Nová cena pre pacienta v lekárni | Stará cena |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Reductil 10 mg x 28 cps | 825 Sk | 1 155 Sk |
| Reductil 15 mg x 28 cps | 957 Sk | 1 468 Sk |
| Reductil 10 mg x 98 cps | 2 279 Sk | 2 945 Sk |
| Reductil 15 mg x 98 cps | 2 669 Sk | 3 778 Sk |

Reductil® (originálny sibutramín) je bez proskripčného obmedzenia.

Pri využití 98 cps balenia (10 mg | 15 mg) **Reductil® (originálny sibutramín)** na redukciu hmotnosti je pacient už cenovo zvýhodnený vo výške **26 dní terapie ZDARMA**. Navyše dostane **edukačné materiály ZDARMA**, o ktoré sa môže prihlásiť na www.reduktip.sk.

Veríme, že redukované ceny pomôžu vašim pacientom úspešne redukovať hmotnosť a budú sa cítiť šťastnejší, krajší a zdravší.

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Ing. Robert Chlup
Product Manager ČR a SR

MVDr. Martin Letko
Business Unit Manager Primary Care

Reductil® Sibutramin

Zkrátená informácia o prípravku

Zloženie: Sibutramini hydrochloridum monohydratum 10 mg v 1 kapsule. Farmakoterapeutická skupina: Liek proti obezite
Charakteristika: Sibutramín účinne redukuje zvýšenú telesnú hmotnosť dvojakým účinkom: Znižuje príjem kalórií cez zvýšený pocit sýtosti po jedle a zvyšuje výdaj energie zrýchleným metabolizmom. Indikácie: Obézni pacienti s indexom telesnej hmotnosti (BMI) 30 kg/m² alebo pacienti s nadváhou (BMI 27 kg/m² alebo vyšším), ak sú prítomné, s obezitou spojené, rizikové faktory ako diabetes II typu a poruchy v lipidovom metabolizme. Mal by sa užívať v spojení s diétou a cvičením ako súčasť programu riadenej hmotnosti, ak by samotná diéta a cvičenie neboli dostatočné. Kontraindikácie: Precitlivosť na sibutramín hydrochlorid alebo na inú zložku prípravku, vážne poruchy príjmu potravy, organická príčina obezity, psychiatrické ochorenie, užívanie inhibítorov MAO alebo ďalších centrálne pôsobiacich prípravkov na liečbu psychiatrických ochorení, nedostatočne kontrolovaná HT, ICHS, srdcové zlyhávanie, arytmie, CMP, hyperthyreóza, ťažká porucha funkcie ľadvín alebo pečene, BHP s retenciou moču, glaukóm, feochromocytóm, lieková alebo alkoholová závislosť, tehotenstvo a kojenie, osoby s intoleranciou laktózy, osoby staršie ako 65 rokov a mladšie ako 18 rokov. Nežiadúce účinky: Objavujú sa prevažne na začiatku liečby, všeobecne nie sú vážne a sú reverzibilné. Najčastejšie sa vyskytuje napr. sucho v ústach, nespavosť, strata chuti a obštipácia, zvýšenie TK, tachykardia, palpitácie. Interakcie s inými liekmi: S určitou opatrnosťou sa môže Reductil® súčasne podávať s liekmi, ktoré sa tiež metabolizujú cez CYP3A4. Reductil® nemá byť podávaný súčasne s inými liekmi, ktoré zvyšujú hladinu serotonínu alebo s liekmi, ktoré môžu zvyšovať TK alebo srdcovú frekvenciu. Reductil 10 mg neovplyvňuje účinnosť perorálnej antikoncepcie. Dávkovanie, spôsob a dĺžka podávania: Pokiaľ lekár neurčí inak, počiatočná dávka je 1 kapsula prípravku Reductil® 10 mg denne. V prípade potreby a pri dobrej tolerancii je možné zvýšiť dávku na 15 mg prípravku Reductil® 1-krát denne. Max. doba podávania 1 rok. Účinnosť a toleranciu je potrebné pravidelne kontrolovať. Balenie: 28 cps 10 mg alebo 15 mg. Výdaj prípravku: Prípravok je viazaný na lekársky predpis a nie je preskripčne obmedzený. Nie je hrađený z verejného zdravotného poistenia. Uchovávanie: Reductil® 10 mg uchovávať na suchom mieste do 25 °C. Prípravok sa nesmie užívať po dátume expirácie (použitelnosti) vyznačenej na obale. Držiteľ rozhodnutia: Abbott Laboratories Slovakia, s. r. o., Bratislava, Slovenská republika. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Abbott Laboratories Slovakia s. r. o., CBC II, Karadžičova 10,
821 08 Bratislava 2, tel.: 02/4445 41 88, fax: 02/4445 44 20,
www.abbott.com, www.reduktip.sk

Rok 2008 v znamení 98

26 dní
ZDARMA



Reductil®  ...sýty z mála

 **Abbott**
A Promise for Life